

## Standards im Bereich HNO

In begründeten Fällen kann /darf nach Rücksprache mit dem Bereichsleiter davon abgewichen werden  
Fremdblutbedarf: s. Bedarfskatalog

OP	OP-Risiko	Vorgesehene Anästhesiemaßnahmen	Narkoseführung	
Adenotomie	Gering	ITN	Standard, kein Fentanyl	
Tonsillektomie	Gering	ITN	Standard	1,5g Cefuroxim
Parazentese + Paukenröhrcheneinlage	Gering	LAMA	Standard, kein Fentanyl	
Septorhinoplastik	Gering	ITN, Rachentamponade	Standard	1,5g Cefuroxim
Septumplastik, Muschelreduktion	Gering	ITN, Rachentamponade	Standard	1,5g Cefuroxim
Endonasale Nasennebenhöhlenoperation	Gering	ITN, Rachentamponade	Standard	1,5g Cefuroxim
Tränenwegsoperation	Gering	ITN, Rachentamponade	Standard, kein Fentanyl	
Panendoskopie (= Mikrolaryngoskopie, Oesophagoskopie, Hypopharyngoskopie, Epipharyngoskopie, Bronchoskopie)	Gering	ITN	Standard, kein Fentanyl	
MLS	Gering	ITN	Standard, kein Fentanyl	
Laser-OP* Larynx, Oropharynx	Mittel	ITN	Standard, kein Fentanyl	
Tympanoplastik, Stapesplastik	Gering	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Cochlea Implantat	Gering	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Mastoidektomie	Mittel	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Lymphknotenexstirpation, SND einseitig	Gering	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Exstirpation med. + lat. Halszyste, - lipom	Gering	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Parotidektomie	Mittel	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Exstirpation Gl. Submandibularis	Mittel	LAMA	Standard	1,5g Cefuroxim
Kehlkopfteilresektion (mit Tracheotomie)	Mittel	ITN/Art/>2Venenzugänge/DK	Standard, Desfluran	1,5g Cefuroxim
Laryngektomie	Hoch	ITN/Art/>2Venenzugänge/DK	Standard, Desfluran	1,5g Cefuroxim
Neck dissektion bds., (RND), Radialis Pm Lappen	Mittel	ITN/Art/>2Venenzugänge/DK, (ZVK)	Standard, Desfluran	1,5g Cefuroxim
Konv. Karzinomresektion Oropharynx	Hoch	ITN/Art/>2Venenzugänge/DK	Standard, Desfluran	1,5g Cefuroxim
Extranasale und endonasale Nasennebenhöhlen-Operation (= laterale Rhinotomie; osteopl. Stirnhöhlen-OP, Orbita)	Mittel	ITN	Standard	1,5g Cefuroxim
OP Haut, Gesichtsschädel (kleine Hauttumore, kleine plastische Eingriffe)	Gering	LAMA	Standard	
Frakturversorgung Mittelgesicht	Mittel	ITN, Rachentamponade	Standard	1,5g Cefuroxim
Nasenbeinaufrichtung	Gering	ITN, Rachentamponade	Standard, kein Fentanyl	
Tracheotomie (bei Luftnot, elektiv)	Mittel	ITN	Standard	1,5g Cefuroxim
Angiome, AVM (Laser*, offene Resektion)	Mittel-Hoch	ITN/Art/>2Venenzugänge/DK, (ZVK, TEE, CellSaver)	Standard, Desfluran	1,5g Cefuroxim

**Standardmonitoring: EKG-3, NIBD, SaO2, BIS, TOF**

Venenpunktion: nach Kälteanästhesie  
Standard Tubus ID: M 8,0; F 7,0; MLS 6,5; i.d.R. li. Mundwinkel  
PONV-Prophylaxe nach PONV-SOP (Prednisolon ersetzt Dexamethason)

**postoperative Analgesie:** 40mg Parecoxib, sofern kein Etoricoxib zur Prämedikation gegeben, ggf. + 2,5g Metamizol  
bei Kindern: 0,5mg/kg KG Parecoxib, ggf. + 25mg/kg Metamizol

**Standardanästhesie:**

\*Bei Tubusbrand: 1 Löschversuch, dann erst Tubus entfernen. Re-

**Fentanyl, Propofol (+40mg Lidocain), Mivacurium Remifentanyl- & Propofol-Perfusor**

bei sehr hohem

bei gültig bis 31.12.2017

Eberhart